

Endokrin-basierte Kombinationstherapie beim nicht-metastasierten Mammakarzinom

Wen betrifft es?
HR+ HER2-
Erhöhtes Rezidivrisiko

Olaparib

Wenn nicht möglich



Abemaciclib

Wenn nicht möglich



Ribociclib

Indikation:
BRCA1/2-Keimbahnmutation *und*:
Primäre OP + adjuvante CTx:
≥ 4 befallene LK *oder*
Neoadjuvante CTx:
non-pCR + CPS EG Score ≥ 3
[Link zur Berechnung CPS EG Score](#)

Studie: OlympiA

Dauer: 1 Jahr

Endokriner Partner:
Prämenopausal: TAM +/- GnRHa *oder* AI + GnRHa
Postmenopausal: TAM *oder* AI

Indikation:
≥ 4 befallene LK
(auch bildgebend vor NACT)
oder
1-3 befallene LK + Tumorgröße ≥ 5 cm
oder
1-3 befallene LK + G3

Studie: monarchE

Dauer: 2 Jahre

Endokriner Partner:
Prämenopausal: TAM +/- GnRHa *oder* AI + GnRHa
Postmenopausal: TAM *oder* AI

Indikation:
N+
oder
T3/4 N0
T2 N0 G3
T2 N0 G2 *und* OncotypeDX RS ≥ 26
T2 N0 G2 *und* Ki67 ≥ 20%

Studie: NATALEE

CAVE: Zulassung ausstehend! KÜ-Antrag notwendig!

Dauer: 3 Jahre

Endokriner Partner:
Prämenopausal: AI + GnRHa
Postmenopausal: AI